



ISSN: 1817-6798 (Print)

Journal of Tikrit University for Humanities

available online at: <http://www.jtuh.tu.edu.iq>
JTUH
 مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية
 Journal of Tikrit University for Humanities

**Asst. Lecture Bashar Farooq
abdulkareem Yousafani**

Mosul University - college of basic education

* Corresponding author: E-mail :
bashar1985@uomosul.edu.iq

Keywords:

Spatial fit, natural factors, land uses, spatial
matching

ARTICLE INFO**Article history:**

Received 15 Sept. 2020

Accepted 11 Oct 2020

Available online 13 Oct 2021

E-mail

journal.of.tikrit.university.of.humanities@tu.edu.iq

E-mail : adxxxx@tu.edu.iq

The Spatial Suitability of Natural Factors Affecting Agricultural Land Uses in the Area of Bashiqa

A B S T R A C T

Natural factors are considered one of the most important controls that control and affect the production of agricultural crops in any region, and through the current research, the researcher addressed the topic of natural factors affecting the production of agricultural crops in the Bashiqa area of the Mosul district of Nineveh Governorate. By determining the spatial changes of agricultural land uses. In addition, building a geographic database (Geo-database), that includes data on the study area phenomenon (geological structure, regression, soil classification and productivity) in addition to agricultural crops in the form of layers. So that each layer includes a specific topic and study of climate elements. Then building a model for spatial suitability and the production of agricultural crops for the purpose of knowing and determining the best spatially appropriate places. Using the spatial analysis tools for the data in Arc-GIS V10.4.2 to be of proven benefit as they carry new information extracted from spatial analysis. Then the process of matching the maps of the agricultural crops with the map of the spatial fitness that produced is completed. Where the study showed that there is a match between the best places for cultivating agricultural crops with the amount of agricultural crops actually cultivated in the study area.

© 2021 JTUH, College of Education for Human Sciences, Tikrit University

DOI: <http://dx.doi.org/10.25130/jtuh.28.2021.11>

الملاءمة المكانية للعوامل الطبيعية المؤثرة على استعمالات الأرض الزراعية في ناحية بعشيقه

م.م. بشار فاروق عبد الكريم يوسفاني / جامعة الموصل - كلية التربية الاساسية

الخلاصة:

تعد العوامل الطبيعية من أهم الضوابط التي تتحكم وتؤثر على انتاج المحاصيل الزراعية في أي منطقة. ومن خلال البحث الحالي تناول الباحث موضوع العوامل الطبيعية المؤثرة على انتاج المحاصيل الزراعية في ناحية بعشيقه التابعة لقضاء الموصل بمحافظة نينوى. من خلال تحديد التغيرات المكانية لاستعمالات الأرض الزراعية. وبناء قاعدة معلومات جغرافية (Geo-database) تضم البيانات الخاصة

بظاهرة منطقة الدراسة المتمثلة بـ (البنية الجيولوجية، والانحدار، وتصنيف الترب وقابليتها الانتاجية) بالإضافة الى المحاصيل الزراعية على هيئة طبقات بحيث تضم كل طبقة (layer) موضوعا محددا، ودراسة عناصر المناخ، ومن ثم بناء نموذج خاص بالملائمة المكانية ونتاج المحاصيل الزراعية لغرض معرفة وتحديد أفضل الأماكن الملائمة مكانيا باستخدام ادوات التحليل المكاني (Spatial Analysis) للبيانات في برنامج Arc GIS V10.4.2 لتكون ذات فائدة مؤكدة كونها تحمل معلومات جديدة مستخلصة أو مستخرجة من التحليل المكاني. ومن ثم تتم عليها عملية التطابق بين خرائط المحاصيل الزراعية مع خريطة الملائمة المكانية التي تم انتاجها. حيث أظهرت الدراسة وجود تطابق بين أفضل الأماكن لزراعية المحاصيل الزراعية مع كمية المحاصيل الزراعية المزروعة فعلا في منطقة الدراسة.

المقدمة:

مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث في مدى فاعلية تمثيل الخرائط الخاصة المعدة بالملائمة المكانية للعوامل الطبيعية على انتاج المحاصيل الزراعية في بيئة نظم المعلومات الجغرافية.

هدف البحث:

تحديد التغيرات المكانية لاستعمالات الارض الزراعية. باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، وربطها بالتغيرات الخضرية الناتجة عن التغيرات بسبب مجموعة العوامل الطبيعية المتمثلة بـ (الأمطار، والتربة، والخصائص التضاريسية)

فرضية البحث

انطلق البحث من الفرضية التي مفادها بأن للتقنيات الحديثة المتمثلة بنظم المعلومات الجغرافية فاعلية كبيرة لاثار العوامل الطبيعية على كمية و انتاج المحاصيل الزراعية في ناحية بعشيقية.


منهج البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الذي يبدأ بالجزئيات وينتهي إلى الكليات والمنهج التحليلي. بالإضافة الى الاعتماد على تقنية نظم المعلومات الجغرافية في تمثيل وتحليل الخرائط منطقة الدراسة باستخدام برنامج (Arc GIS 10.4.2).

(١-١) موقع منطقة الدراسة:-

تعد ناحية بعشيقية إحدى النواحي التابعة إدارياً الى قضاء الموصل مركز محافظة نينوى. وتقع في القسم الشرقي من قضاء الموصل , يحدها من الشمال قضاء الشيوخان ومن الغرب قضاء تلكيف ومن الجنوب الغربي حدود بلدية الموصل ومن الجنوب ناحية برطلة التابعة إلى قضاء الحمدانية ومن الشرق ناحية العشائر السبعة التابعة الى قضاء عقرة. ونهر الخازن ومن الجهة الجنوبية الغربية نهر الخوصر، لاحظ الخريطة (١-١) , أما فلكيا فهي تقع بين دائرتي عرض ٢٢° ٣٦' و ٣٥° ٣٦' شمالاً، وبين خطي طول ١٠° ٤٣' و ٣٣° ٤٣', شرقاً^(١), ويبلغ مجموع مساحة ناحية بعشيقية (٥١٣ كم^٢) موزعة على (٥٧) مقاطعة اي ما يعادل (٢٣٠,٨٥٠) دونم، وقد بلغت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة (١١٥٣٤١) دونما في حين بلغت المساحات الغير صالحة للزراعة (٢٢١٠١) دونم من مجموعة المساحة الكلية للناحية^(٢) .

موقع منطقة الدراسة (1-1) خارطة



المصدر: اعتمادا على الخرائط الادارية لمحافظة نينوى وبرنامج ARC GIS 10.4.2.

شكل (١-١) المقاطعات الزراعية في ناحية بعشيقية

FID	Shape	ID	رقم منطقة	تسمية منطقة	شهرتها
0	Polygon	1	1	قريه بعشيقه	
1	Polygon	2	2	بعشيقه الغربية	
2	Polygon	3	3	بعشيقه الشرقية	
3	Polygon	4	4	قصر راسد بعشيقه	
4	Polygon	5	5	بساتين بعشيقه	
5	Polygon	6	6	بحراني الحويه	
6	Polygon	7	7	بحراني الشمالية	
7	Polygon	8	8	بساتين بحراني	
8	Polygon	9	9	قريه بحراني	
9	Polygon	10	10	قصر راسد بحراني	
10	Polygon	11	9	كند	
11	Polygon	12	10	كويكان	
12	Polygon	13	12	ابوجريوة	
13	Polygon	14	14	الراويش	
14	Polygon	15	15	قصر سويد	
15	Polygon	16	16	قريه عنة شيد	
16	Polygon	17	18	كوري عومان	
17	Polygon	18	20	قوران عنة	
18	Polygon	19	30	كثاني ماران	
19	Polygon	20	31	شوركة معا	
20	Polygon	21	33	حمران	
21	Polygon	22	34	شرف حمران	
22	Polygon	23	47	قريه اورطة خراب	
23	Polygon	24	52	طبارا	
24	Polygon	25	52	مغارة مطرب	
25	Polygon	26	53	طن بايزيد	
26	Polygon	27	53	قريه بايويوت	
27	Polygon	28	54	بازويه	
28	Polygon	29	54	ميركي	
29	Polygon	30	55	قريه ديرك	
30	Polygon	31	56	جندبي	
31	Polygon	32	57	وادي السحاق	
32	Polygon	33	58	مغارة سبي	
33	Polygon	34	59	كادوة	
34	Polygon	35	60	قريه الفاضلية	
35	Polygon	36	61	قريه خورسيما	


36	Polygon	37	63	قريه بارينه
37	Polygon	38	72	طوبز او
38	Polygon	39	95	حصار
39	Polygon	40	97	كلجة
40	Polygon	41	99	قلعة توك
41	Polygon	42	100	شيخ شيلي
42	Polygon	43	101	باغزده عرب
43	Polygon	44	128	السوق
44	Polygon	45	129	خراب دليل
45	Polygon	46	130	نيس خراب
46	Polygon	47	131	جوركي
47	Polygon	48	132	سيكاني
48	Polygon	49	134	دورلان
49	Polygon	50	135	بيرينك بيرحان
50	Polygon	51	136	قوبان
51	Polygon	52	137	اجه جق
52	Polygon	53	11	قريه ابو جريوة
53	Polygon	54	13	قريه الراويش
54	Polygon	55	17	قريه قريه شيد
55	Polygon	56	122	بلدية اورطة خراب
56	Polygon	57	123	بلدية الفاضلية

(٢-١) البنية الجيولوجية

وهي أحد العوامل التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحديد طبقة التضاريس وعدد من الخصائص المؤثرة في المياه الجوفية كماً ونوعاً وتحديد العناصر المعدنية التي تدخل في تركيب التربة والتي تؤثر في خواص النشاط الزراعي^(٣). ومن خلال الخارطة (٢-١) نلاحظ تعدد التكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة وتباين خصائصها من الأقدم إلى الأحدث ، إذ يظهر تكوين البلاسي (الايوسين الاعلى) في وسط وشمال ناحية بعشيقه ويتألف من الحجر الحيوي والطباشير المتبلور والحجر الحيوي المتبلور مما جعله تكويناً له ممرات للمياه لكثرة صخور الحجر الحيوي التي تحتوي على الفواصل والشقوق^(٤). أما تكوين الفتحة (الايوسين الاوسط) يتكون من طبقات متعاقبة من صخور الجبس والمسار الأخضر والأحمر وعدد من الطبقات قليلة السمك من الحجر الحيوي ويوجد هذا التكوين في وسط ناحية بعشيقه^(٥). ويشكل تكوين إنجانة (المايوسين الاعلى) بعض مناطق شرق الناحية ويمتد بشريط الى الغرب بالإضافة الى بعض مناطق جنوب ناحية بعشيقه^(٦)، وتعد التربة المتبقية أكثر رسوبات الزمن الرابع وهي ترب تطورت من الصخور التي تتركز عليها وتعد التربة الجبسية هيه السائدة والتي يختلف سمكها من سنتيمترات عدة الى (٢٠) متراً وتشغل مساحات واسعة من الجزء الجنوبي الغربي وجزء قليل من ناحية بعشيقه^(٧)، بالإضافة الى ترسبات السهل الفيضي التي تظهر على نهر دجلة وتتكون من الحصى والرمل غير المتماسك والغرين والطين و تشغل مساحة صغيرة جداً غرب ناحية بعشيقه (منطقة الدراسة). وتظهر ايضاً ترسبات المنحدرات والتي تعد ذات خصائص شكلية وحجمية متباينة وغالباً تقع في اقصى شمال الناحية وكذلك على شكل شريط مستمر وسط

ناحية بعشيقة. أما تكوين المقدرات يوجد في القسم الشرقي من الناحية وفي جزء صغير شمال ناحية بعشيقة يتألف من طبقة سميكة من الحجر الرملي المتداخل مع صبغات الحجر الطيني والغريني وذات مسامية نفاذية عالية للمياه^(٨).

خارطة (٢-١) البنية الجيولوجية في ناحية بعشيقة



المصدر: بالاعتماد على الخارطة الجيولوجية لمحافظة نينوى مقياس ١:٢٥٠,٠٠٠ وبرنامج ARC GIS 10.4.2.

(٣-١) الانحدار

يعرف الانحدار بأنه الزاوية المحصورة بين المستوى الافقي وخط الميل نفسه^(٩). من ملاحظة الجدول (١-١) والخارطة (٣-١) يتضح وجود مستويات متباينة من الانحدار من (٦-٣٠) فاكتر حسب مديات الانحدار عند ذلك. إذ تمثل الفئة الأولى السهول والوديان باللون الاخضر عميق جداً تبعاً لدرجات الانحدار (٠-١٠.٩) ذات التصنيف المسطح والمساحة التي تشغلها هذه الفئة (١٨٧.٤٥ كم^٢) وهي تمثل نسبة (٣٦.٥٣%) من المساحة الكلية من مديات الانحدار وتنتشر في المناطق الجنوبية والغربية من قضاء بعشيقة. اما الفئة الثانية لمستويات الانحدار (٢-٧.٩) فتمثل مناطق السفوح (سفوح اقدام الجبال) ذات التموج الخفيف تمثل اللون الاخضر الفاتح وتبلغ مساحتها (٢٦٥.١٧.٦ كم^٢) وتمثل نسبة (٥١.٦٩%) من المساحة الكلية لمديات الانحدار وتنتشر في اغلب مناطق منطقة الدراسة باستثناء قسم من المناطق الشمالية والوسطى. اما الفئة الثالثة لمستويات الانحدار فتتراوح (٨-١٥.٩) وتمثل الاراضي المتموجة وهي تلال منخفضة وتحمل اللون الاصفر وإن المساحة التي تشغلها هذه الفئة (٤١.٣٧ كم^٢) وبنسبة مئوية بلغت (٨.٠٦%) من اجمالي مساحة الأراضي في القضاء


وتنتشر في بعض الاجزاء الشمالية والوسطى من القضاء . أما مديات الانحدار التي تقع مستوياتها بين (١٦-٢٩.٩) المتمثلة بالأراضي المقطعة المجزأة وهي تلال مرتفعة المتمثلة باللون البني الفاتح وإن المساحة التي تشغلها هذه الفئة (١٧.٤٥ كم^٢) من المساحة الكلية لمديات الانحدار ونسبة مئوية بلغت (٣.٤%) وتنتشر في الاجزاء الشمالية والوسطى وتقل في بقية الاجزاء . بينما بلغت مساحة الفئة الخامسة والاخيرة للانحدار التي يزيد انحدارها عن ٣٠ درجة بلون بني غامق جداً والمساحة التي تشغلها هذه الفئة (١.٥٦ كم^٢) اما النسبة المئوية التي تشغلها هذه الفئة هي (٠.٣٢%) المتمثلة في المناطق الشمالية من قضاء بعشيق . وبذلك نستنتج وجود نوع من التجانس في سطح المنطقة طوبوغرافياً اذ ان المنطقة يمكن أن تصنف ضمن الأراضي المنبسطة قليلة السموح إذ شكلت الأراضي التي لا يزيد انحدارها (٠-٩,٧) نسبة (٨٨%) من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة بينما شكلت الأراضي المتموجة نسبة (٨%) من اجمالي المساحة وبلغت نسبة الأراضي التلالية والمرتفعة (٤%) من اجمالي المساحة مما يجعلها صالحة للاستخدام الزراعي واستخدام المكتبة بسهولة لسعتها وانبساطها .

جدول (١-١) مديات الانحدار في ناحية بعشيق

شكل السطح	الانحدار بالدرجات	التصنيف	مساحة الانحدار كم ^٢	نسبة الانحدار %
مسطح	1.9	سهول، وديان	187.45	36.53
متموج خفيف	7.9	سهول تحاتية نهريّة وسفوح اقدام الجبال	265.17	51.69
متموج	15.9	تلال منخفضة	41.37	8.06
مقطعة (مجزأة)	29.9	تلال مرتفعة	17.45	3.4
منخفضة بدرجة عالية	فما فوق 30	جبال	1.56	0.32

المصدر: بالاعتماد على نموذج الارتفاع الرقمي (Dem) وبرنامج Arc (GIS)

خارطة (١-٣) مديات الانحدار في ناحية بعشيقية



المصدر: بالاعتماد على نموذج التضرس الرقمي DEM دقة 30m وبرنامج Arc GIS ١٠.٤.٢ .

(١-٤) التربة

انواع الترب:

١- تربة بنية ذات السمك العميق:

تمتاز بكونها ترب جيدة وذات سمك عميق وهي أراض تصلح للزراعة الحنطة والشعير بشكل كبير وتمتاز بخصوبة جيدة وذات سمك عميق يسمح بانتشار وامتداد جذور النباتات النامية من اجل الحصول على الماء والعناصر الغذائية وهي ترب متطورة وناضجة تبلغ المساحة التي تشغلها في ناحية بعشيقية (٣٧٢.٥٦) كم^٢ من مساحة الناحية وتوجد بمساحات كبيرة تمتد من الشرق الى الغرب وفي الاجزاء الجنوبية والوسطى من الناحية.


٢- تربة بنية ذات سمك متوسط عميقة التعرية:

حيث تكون انتاجها اقل من النوع السابق وهي تربة بنية تمتاز بسمك متوسط وذات طبوغرافية متموجة ولهذا تعاني من التعرية العميقة تبلغ مساحتها (٤٢,٢٥) كم^٢ من مساحة الناحية وتشغل أجزاء من شمال ناحية بعشيقية.

٣- تربة الليثوسول مع الكلس:

تمتاز هذه التربة بأنها صخرية قليلة العمق تحتوي على صخور كلسية وذات فتات أو قطع صخرية والتي تعد مادتها الأصلية، أما صفاتها فإنها تتميز ذات نسجة طينية لومية بلغت مساحتها (٩٨.٢٩) كم^٢ وتوجد في بعض الاجزاء الشمالية والوسطى بالإضافة الى جزء صغير جنوب ناحية بعشيقه. لاحظ خارطة (٤-١).

خارطة (٤-١) انواع الترب في ناحية بعشيقه



المصدر: بالاعتماد على خارطة بيورنك مقياس ١: ١٠٠٠٠٠٠٠ وبرنامج Arc GIS 10.4.2 .

(٥-١) القابلية الانتاجية

تعتمد خصوبة التربة وقابليتها الإنتاجية على مجموعة عوامل متصلة ومتفاعلة بعضها وإن ضعف وانعدام هذه العوامل تقلل من القدرة الإنتاجية للتربة. وفي مقدمة هذه العوامل المواد المعدنية والعضوية اللازمة لغذاء النبات، فضلاً عن نسجة التربة وتركيبها ومقدار احتواء التربة على الماء والهواء^(١٠) . ومن خلال ملاحظة الخارطة (٥-١) نجد أن الترب في منطقة الدراسة تقسم من حيث قابليتها الانتاجية الى الأنواع التالية:

تقع هذه الأراضي ضمن الصنف الثالث ويتسم هذا النوع من التربة بكونه جيد للزراعة وإن العامل المحدد للإنتاجية فيه هو نسجة (t) إذ تؤثر النسجة بشكل اساس على نمو النباتات في المنطقة إذ تتكون النسجة والتربة المزيجية من الرمل ويكون عمقها اقل من (٤٢) انجاً وتغطي (١٧٤,١٣٦ كم^٢) من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة وينتشر هذا النوع من التربة في بعض الاجزاء الشمالية الشرقية من ناحية بعشيقة .

٣/te

تقع ضمن الصنف الثالث ويتسم هذا النوع من التربة بصفات التربة السابقة من حيث النسجة والعمل والتكوين ايضاً جيدة للزراعة وفيها العامل المحدد للإنتاجية هو النسجة (t) وعامل التعرية المائية والهوائية (E) ويكون لهذا العامل تأثير كبير في انتاجية هذه التربة إذ تكون قابليتها الزراعية اقل من سابقتها بسبب تعرضها للتعرية اما مساحتها بلغت (٢١٢,٣١١ كم^٢) من مساحة ناحية بعشيقة وتقع في الاجزاء الجنوبية الغربية من ناحية بعشيقة (منطقة الدراسة)


٥ / e

تقع هذه التربة ضمن الصنف الخامس من اصناف التربة والعامل المحدد للإنتاجية لهذا النوع من التربة هو التعرية المائية (e), وقد شغلت مساحة قدرها (١٢,٦٦ كم^٢) من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة, وتعاني تربة هذا النوع من معوقات يتمثل في الرطوبة المائية وزيادة نسبة الصخور ويوجد هذه النوع من التربة في اجزاء صغيرة وسط وشمال ناحية بعشيقة .

٣٤/ti

تقع ضمن الصنف الثالث والرابع والعامل المحدد بها هو النسجة والانحدار وتكون جيدة للزراعة وفيها عامل النسجة (t) وعامل الانحدار (i), اما مساحتها فقد بلغت (٦٠,٥٥ كم^٢) من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة. يوجد هذا النوع في المناطق الجنوبية الغربية من منطقة الدراسة ناحية بعشيقة . لاحظ خارطة (١-٥) .

خارطة (١-٥) القابلية الإنتاجية للتربة في ناحية بعشيقه



المصدر: بالاعتماد على خارطة القابلية الانتاجية للتربة مقياس ١:١٠٠٠٠٠٠٠ وبرنامج ARC GIS 10.4.2 .

(١-٦) المناخ

(1-6-1) درجة الحرارة


تعد درجة الحرارة من العناصر المناخية المهمة المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر في حياة النبات إذ تحدد درجة الحرارة انتشار المحاصيل الزراعية فضلاً عن وقت زراعتها ونضجها خلال العام وإن درجة الحرارة تحدد العمليات الفسيولوجية التي تزداد بزيادة درجة الحرارة وهي النمو، والتركيب الضوئي، التنفس، امتصاص الغذاء، معدل النتج^(١). فضلاً عن تأثيرها في العناصر المناخية الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة تتوزع الرياح ونظام هبوبها وتأثر أيضاً في تكوين الأمطار^(٢). ومن خلال الجدول رقم (٢) نجد أن منطقة الدراسة تتمتع بارتفاع درجة الحرارة وخاصة في أشهر الصيف إذ يبلغ درجة الحرارة في شهر حزيران (٣١.٥م) وتموز (٣٥م) وفي شهر آب (٣٤.٥م)، أما في شهر كانون الثاني فإن درجة الحرارة تبلغ (٦.٧م) وكانون الأول (٩.١م) نجد أن النباتات تنمو خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة في الصيف .

جدول (٢-١) معدل درجة الحرارة .

المحطة	كانون الثاني	شباط	اذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	اب	ايلول	تشرين الاول	تشرين الثاني	كانون الاول	المجموع
الموصل	6.7	9.1	13.4	18.2	25.2	31.5	35	34.5	28.7	22.2	13.8	9.0	265.4

المصدر: بالاعتماد على الهيئة العامة للأواء الجوية العراقية، قسم المناخ، بيانات غير منشورة لمدة ١٩٩٥ - ٢٠١٠

شكل (٢-١) معدل درجات الحرارة



المصدر: بالاعتماد على الجدول رقم (٢)

(١-٦-٢) السطوع الشمسي


تتمتع منطقة الدراسة بساعات طويلة من السطوع في فصل الصيف بسبب سكونها من السحب وطول النهار وارتفاع درجة الحرارة الذي تحتاجها المحاصيل الصيفية. من خلال ملاحظة الجدول رقم (٣) نجد أن هنالك فرقاً كبيراً بين السطوع في فصل الصيف والشتاء إذ بلغت في شهر حزيران (١١.٩) و تموز (١١.٨) وآب (١١.٢) بينما كانون الأول (٤.٨) وكانون الثاني (٤.٩) وشباط (٥.١) وعليه يمكن القول أن المنطقة الدراسة تتمتع بعدد ساعات سطوع شمسي تكفي لسد حاجة متطلبات المحاصيل الشتوية والصيفية.

جدول (٣-١). معدل ساعات السطوع الشمسي

المحطة	كانون الثاني	شباط	اذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	اب	ايلول	تشرين الاول	تشرين الثاني	كانون الاول	المجموع
الموصل	4.9	5.1	7	8	9.6	11.9	11.8	11.2	10.4	8.3	6.4	4.8	99.4

المصدر: بالاعتماد على الهيئة العامة للأواء الجوية العراقية، قسم المناخ، بيانات غير منشورة لمدة ١٩٩٥ - ٢٠١٠ .

شكل (١-٣) معدل ساعات السطوع الشمسي



المصدر: بالاعتماد على الجدول رقم (٣)

(1-6-3) الامطار :


يتضح من الجدول (٤) أن هنالك تباينا في كمية الأمطار في منطقة الدراسة إذ تبدأ الأمطار بالسقوط في شهر أيلول (0.2) ملم ثم يزداد التساقط في الأشهر التالية حتى يصل أعلى قيمة تساقط في شهر كانون الثاني وشباط وكانون الأول (68.6 - 56.9 - 54.1 ملم) على التوالي وانعدام التساقط في شهر اب (٥) ملم .

جدول (١-٤) المعدل الشهري لكمية الامطار.

المحطة	كانون الثاني	شباط	اذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	اب	ايلول	تشرين الاول	تشرين الثاني	كانون الاول	المجموع
الموصل	68.6	56.9	55.3	36.3	8.5	1.0	0.4	0	0.2	12.3	34.7	54.1	328.5

المصدر: بالاعتماد على الهيئة العامة للأحواء الجوية العراقية، قسم المناخ، بيانات غير منشورة لمدة ١٩٩٥ - ٢٠١٠ .

شكل (١-٤) المعدل الشهري لكمية الامطار



المصدر: بالاعتماد على الجدول رقم (٤)

(4-6-1) الرطوبة النسبية


إن المعدل الشهري للرطوبة النسبية في منطقة الدراسة قد سجل أعلى قيمة تبلغ اقصاها في اشهر الشتاء كانون الثاني وشباط وكانون الأول وقد بلغت (79.9 – 73.4 – 74.2%) على التوالي بينما سجلت أقل قيمة في أشهر الصيف حزيران وتموز وآب (27 – 25.1 – 27.1 %) على التوالي ويرجع سبب التباين في الرطوبة في منطقة الدراسة الى ندرة المطر وارتفاع الحرارة في الصيف وتساقط المطر وانخفاض الحرارة في الشتاء وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال الجدول (٥) .

جدول (٥-١) المعدل الشهري للرطوبة النسبية

المحطة	كانون الثاني	شباط	اذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	اب	ايلول	تشرين الاول	تشرين الثاني	كانون الاول	المجموع
الموصل	79.9	73.4	66.6	62.8	43.1	27	25.1	27.1	34	34.8	60.3	74.2	608.3

المصدر: بالاعتماد على الهيئة العامة للأقواء الجوية العراقية، قسم المناخ، بيانات غير منشورة لمدة ١٩٩٥ – ٢٠١٠

شكل (٥-١) المعدل الشهري للرطوبة النسبية



المصدر: بالاعتماد على الجدول رقم (٥)


(1-2) توزيع المحاصيل الزراعية في ناحية بعشيقية :

(1-1-2) القمح :

ينتمي محصول القمح الى العائلة النجيلية . ويحتل موقع الصدارة في قائمة الحبوب الغذائية وتعتمد عليها اكثر من ثلث سكان العالم في غذائه لغناه بالبروتينات والنشا وبعض الفيتامينات مثل فيتامين B , E (13). بلغت المساحة المزروعة في منطقة الدراسة بمحصول الحنطة ٥٢٨٤٢ دونم من مجموع المساحة الزراعية

موزعة على (٥٠) مقاطعة بلغت اكبر مساحة في مقاطعة كداد واقل مساحة في مقاطعة اولمش. ويتركز محصول الحنطة في اغلب اجزاء ناحية بعشيقه , وضمن المرتبة الاولى من مقاطعات, طوبزلاوا, بازوايا, اورطاخراب, سيخاني, عمر قابجي, خور سيباط, كويكان, كداد, ال جبران, الدراويش, حوصرة. بينما ضمن المجموعة الثانية من مقاطعات, ابو جربوع, جوري, غريبان, تلياره, كانونا, الفاضلية, دبردان, بيرحلان , جوليجا, لاحظ خارطة (١-٢) .

خارطة (١-٢) توزيع القمح على المقاطعات الزراعية في ناحية بعشيقه




المصدر: بالاعتماد على برنامج Arc GIS 10.4.2 و ملحق رقم (١)

(٢-١-٢) الشعير

الشعير نبات عشبي ينتمي الى الفصيلة النجيلية, وقد عرفت زراعته منذ اقدم العصور⁽¹⁴⁾. حيث عثر على آثار زراعته في قرية جرمو, ويعد الشعير من المحاصيل الحقلية الشتوية المهمة المعتمدة في العراق الى جانب القمح وخصوصا في الزراعة الديمية كما هو الحال في منطقة الدراسة, اما من حيث مقومات زراعته فعي من المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة والملوحة بحيث ينمو في التربة ذات الملوحة, ويفضل التربة الغرينية والغرينية المزيجية جيدة الصرف لذا يزرع في المناطق الأقل انتاجية بالنسبة للقمح⁽¹⁵⁾. بلغت المساحة المزروعة بالشعير ٣٧٩٤٠ دونما من مجموع المساحات المزروعة في ناحية بعشيقه . اذ بلغت اكبر مساحة في مقاطعة اورطة خراب واقل مساحة في مقاطعة بحزاني الشمالية, ويتركز محصول الشعير في وسط الناحية وبعض الاجزاء الشمالية والشرقية والغربية للناحية . احتلت المرتبة الأولى في

مقاطعات طوبزوا، بازوايا، اورطة خراب، اما المرتبة الثانية في مقاطعات ابو جربوع و كوري، غريبان، الدراويش، تليارا، عمر قابجي، خور سيباط، كودان، حصار. لاحظ الخريطة (٢-٢).

خريطة (٢-٢) توزيع الشعير على المقاطعات الزراعية في ناحية بعشيقه




المصدر: بالاعتماد على برنامج ARC GIS 10.4.2 و ملحق رقم (١)

(3-1-2) الخضراوات

تمتاز الخضراوات عن بقية المحاصيل الزراعية بانخفاض نسبة البروتينات والمواد الدهنية، وتخزن غذاءها في الجذور والسيقان أو الاوراق أو الثمار فتمتاز بزيادة نسبة الاستهلاك في أجزائها^(١٦). بلغت المساحة المزروعة بالخضراوات في منطقة الدراسة ١٢٢٧ دونم من مجموع المساحة المزروعة في ناحية بعشيقه، يتركز محصول الخضراوات على امتداد من الجنوب باتجاه الشمال، الخضراوات الصيفية الديمية (البطيخ + القثاء) تظم المرتبة الأولى في مقاطعة سيساني، أما المرتبة الثانية تظم المقاطعات حصار، بعشيقه الغربية، بعشيقه الجنوبية، لاحظ خريطة (٢-٣).

خارطة (٢-٣) توزيع محاصيل الخضراوات على المقاطعات الزراعية في ناحية بعشيقية




المصدر: بالاعتماد على برنامج Arc GIS10.4.2 و ملحق رقم (١)

(4-1-2) البقوليات

تأتي البقوليات في المرتبة الثانية من الأهمية بين محاصيل الحبوب الغذائية حيث تعد من المواد الغذائية الأساسية للإنسان لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والنشأ والأملاح المعدنية تصل نسبة البروتين في بعض أنواعها مثل الباقلاء إلى (٤٠%) و (١٠-٢٠%) زيت^(١٧). بلغت المساحة المزروعة في منطقة الدراسة ١٥٠٨ دونم من مجموع المساحة المزروعة في ناحية بعشيقية، احتلت المساحة الأكبر في مقاطعة سيكاني وأقل مساحة في قرية تبة شبك وتيس خراب، باريم، كانونة، توزعت البقوليات في المناطق الجنوبية والشمالية والمنطقة الغربية، ضمت المرتبة الأولى سيساني، والمرتبة الثانية كل من مقاطعات كويكان، كداد، جبران، دوبردان، قليجا، حصار. لاحظ خارطة (٢-٤).

خارطة (٢-٤) توزيع البقوليات على المقاطعات الزراعية في ناحية بعشيقه




المصدر: بالاعتماد على برنامج Arc GIS 0.4.2 ملحق رقم (١)

(٢-١-٥) البساتين

بلغت المساحة المزروعة بالبساتين ٧٩٧٣ دونما من مجموع المساحة المزروعة في ناحية بعشيقه، وتباينت هذه المساحات ما بين المقاطعات إذا بلغت اكبر مساحة في مقاطعة الفاضلية وأصغر مساحة في مقاطعة تليارة، وتوزعت البساتين في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية بالإضافة إلى الجنوبية ضمت المرتبة الاولى في مقاطعات الفاضلية، بابيوخ، كوبا، كليا، وضمت المرتبة الثانية في مقاطعة بعشيقه الشرقية لاحظ خارطة (٢-٥) .

خارطة (٢-٥) توزيع البساتين على المقاطعات الزراعية في ناحية بعشيقه




المصدر: بالاعتماد على برنامج Arc GIS 10.4.2 و ملحق رقم (١)

بناء النموذج الهيكلي Model Builder (٢-٢) للملاءمة البيئية للأراض الزراعية

تم بناء النموذج الهيكلي في بيئة برنامج Arc GIS 10.4.2 بعد تحديد الطبقات ودرجة أهميتها وأوزانها، اذ يعتمد النموذج الهيكلي على أساس تبسيط المشاكل المعقدة والتداخل في البيانات وعلاقاتها المكانية والوصفية، لذلك يتم صياغة هذا النموذج لتبسيط المشكلات الاساسية وصياغة طريقة حلها من خلال ما يسمى بالتخطيط البياني لمراحل العمل، لاحظ الشكل (٢-١)، بعد الانتهاء من بناء النموذج وعملية التحليل في بيئة نظم المعلومات الجغرافية تم التوصل الى اعداد خارطة الملاءمة البيئية للأرض الزراعية. مقسمة الى ثلاثة اصناف على اساس التشابه في الخصائص حيث احتلت المناطق الجيدة جدا للزراعة القسم الاكبر بمساحة ٢٧٦ كم^٢، حيث تمتاز هذه المناطق بكون اغلب اراضيها منبسطة وقليلة الارتفاع وترتبطها هي من الترب البنية الجيدة للزراعة. اما المناطق الجيدة للزراعة احتلت مساحة قدرها ١٧٩ كم^٢ موزعة في القسم الشمالي من الناحية وجزء صغير في الجنوبي الغربي. واخيرا المناطق تاغير الصالحة للزراعة التي احتلت مساحة ٥٨ كم^٢ لتشمل اجزاء صغيرة في المناطق الجبلية المرتفعة ذات نسبة انحدار عالية والترب فيها ترب صخرية غير صالحة للزراعة وعامل التعرية يكون بارز فيها والخارطة (٢-٦) توضح نوع ودرجة الملاءمة البيئية.

خارطة (٢-٦) الملائمة المكانية للارض الزراعية في ناحية بعشيقه




المصدر: اعتمادا على الخرائط (الجيولوجية, الانحدار, الارتفاعات, أنطقه المطر, الترب, القابلية الانتاجية للتربة), وبرنامج
ARC GIS 10.4.2

جدول (٢-١) الاصناف والمساحات في خارطة الملاءمة المكانية للارض الزراعية في ناحية بعشيقه

ت	الصنف	المساحة/كم ²	النسبة %
1	جيدة جدا للزراعة	٢٧٦	٥٣.٨%
2	جيدة للزراعة	١٧٩	34.89%
3	غير جيدة للزراعة	٥٨	11.3%
	المجموع	٥١٣	100%

المصدر: اعتمادا على الخارطة (٢-٦).

الشكل (١-٢) النموذج الهيكلي Model Builder




المصدر: باستخدام برنامج Arc catalog.

(٣-٢) التطابق المكاني لإنتاج المحاصيل الزراعية وخارطة الملاءمة البيئية في ناحية بعشيقه:


تم اعداد خرائط التطابق المكاني لخارطة الملاءمة البيئية مع انتاج المحاصيل الزراعية في القضاء باستخدام تقنيات التطابق (overlay) في نظم المعلومات الجغرافية من خلال تطابق الخرائط وكشف العلاقات المكانية الارتباطية والتي تظهر مستوى عالياً من التطابق بين مناطق تواجد اصناف الملاءمة الجيدة جدا والجيدة للأرض الزراعية التي تمتاز بتربتها الجيدة للزراعية وسطحها المنبسط القليل الانحدار مع مناطق الانتاج العالية للمحاصيل الزراعية. في حين لا يوجد انتاج للمحاصيل الزراعية في المناطق الصخرية وتكون تربتها قليلة الجودة وسطحها متضرس وذات انحدار شديد وصنفت ضمن مناطق الملاءمة غير الجيدة من الناحية الزراعية و توضح الخرائط (٢-٧) و (٢-٨) و (٢-٩) و (٢-١٠) و (٢-١١). نوع من التوافق المكاني بين مناطق انتاج المحاصيل الزراعية ومناطق الملاءمة البيئية الجيدة جدا والجيدة إذ تتوافر العوامل الطبيعية التي تساعد على الزراعة.

خارطة (٧-٢) تطابق محاصيل القمح مع الملاءمة البيئية للأرض الزراعية




المصدر: اعتمادا على تطابق خارطة الملاءمة البيئية للأرض الزراعية مع خارطة القمح.

خارطة (٨-٢) تطابق محاصيل الشعير مع الملاءمة البيئية للأرض الزراعية




المصدر: اعتمادا على تطابق خارطة الملاءمة البيئية للأرض الزراعية مع خارطة الشعير

خارطة (٢-٩) تطابق محاصيل البقوليات مع الملاءمة البيئية للأرض الزراعية




المصدر: اعتمادا على تطابق خارطة الملاءمة البيئية للأرض الزراعية مع خارطة البقوليات.

خارطة (٢-١٠) تطابق محاصيل الخضراوات مع الملاءمة البيئية للأرض الزراعية



المصدر: اعتمادا على تطابق خارطة الملاءمة البيئية للأرض الزراعية مع خارطة الخضراوات.

خارطة (٢-١١) تطابق محاصيل البساتين مع الملاءمة البيئية للارض الزراعية



المصدر: اعتمادا على تطابق خارطة الملاءمة البيئية للأرض الزراعية مع خارطة البساتين.

لاستنتاجات

- ١- كشفت الدراسة عن امكانية استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل البيانات المكانية للظواهر الجغرافية المختلفة.
- ٢- وجود تجانس وتطابق بين كمية المحاصيل الزراعية المزروعة فعلا مع المناطق الملائمة جدا للزراعة
- ٣- وجود علاقة واثر بين مظاهر السطح وعناصر المناخ مع انتاج المحاصيل الزراعية وكميتها.
- ٤- أظهرت الدراسة كفاءة هيكلية البناء النموذجي (Model) لإنتاج خرائط الملائمة المكانية للأراضي الزراعية

Sources:

- (١) Nineveh Agriculture Directorate, Land Department, Bashiqa sub-district map by district, unpublished data, 2019.
- (2) The area was extracted using Arc GIS/10.4.2 .
- (3) Suhaib Hassan Khader, The Effect of Saddam Dam on the Properties of Groundwater in Nineveh Governorate, a master's thesis, unpublished, Department of Geography, College of Education, University of Mosul, 2001, p. 11.
- (4) Asmaa Khaled Jarjis, Problems Representing Groundwater Depths in the Information Systems Program, Tel Kaif District, Master's Thesis, unpublished, Department of Geography, College of Education, University of Mosul, 2005, p. 9.
- (5) Rayan Ghazi al-Banna, Gemour Physiology of Qand Structure in Northern Iraq, Master's Thesis, unpublished, College of Science, University of Mosul, 2002, p. 24.
- (6) Muhammad Ali Al-Rashidi, Sedimentary Study of the Formation of Injaz in Qand Fold, Northern Iraq, Master's Thesis, unpublished, College of Science, University of Mosul, 2005, p. 7.
- (7) Manal Raafat, Spatial Analysis of Agricultural Land Uses in Tal Afar District, doctoral thesis, unpublished, Mosul University, 2013, pp. 26-27.
- (8) Hanan Suleiman Daoud, Studying the geological formations and soils of the Mosul Dam for the use of Geographical Information Systems (GIS), diploma thesis, unpublished, College of Education, University of Mosul, 2008, p. 13.
- (9) Muhammad Sobhi Abd al-Hakim, Maher Abd al-Hamid al-Laithi, Cartography, Anglo-Egyptian Library, Cairo, 2005, p. 251.
- (10) Ali Hussein Shalash, Soil Geography, 1st Edition, Basra University Press, Basra, 1986, p. 45.
- (11) Nibras Abbas Yas, The Impact of Climate on Cultivation of Summer Vegetables in the Middle Euphrates Region, Master Thesis, Ibn Rushd College, Department of Geography, University of Baghdad, 2006, pg. 40.
- (12) Mikhlif Shalal Marei, Ibrahim Muhammad Hassoun Al-Qassab, Agricultural Geography, Dar Al-Kutub for Printing and Publishing, Mosul, 1996, p. 19.
- (13) Sabri Mustafa Al-Bayati, The optimum choice in agriculture between wheat and barley crops in the rain-sustained area of Dimiya, Journal of the Iraqi Geographical Society, No. (36). December, 1997, p. 99.
- (14) Muhammad Safina, Muhammad Samih Tata, and Ali Diab, Agricultural Geography, first edition, Syria, Damascus University, 2003, p. 189

- (15) Sabri Mustafa Al-Bayati, The optimum choice in agriculture between wheat and barley crops in the rain-sustained area of Dimiya, Journal of the Iraqi Geographical Society, No. (36). December, 1997, p. 99.
- (16) Ibrahim Al-Mashhadani, Agricultural Geography, first edition, Al-Mustansiriya University, Al-Irshad Press, Baghdad, 1970, pp. 276-283.
- (17) Ali Wahb, Geography of Agricultural Economics, (Elements and Production), 1st Edition, Beirut, 1987, p. 119.

ملحق رقم (١) توزيع المحاصيل الزراعية على المقاطعات في ناحية بعشيقية

ت	اسم المقاطعة	قمح	شعير	بقوليات	بساتين	خضراوات	ت	اسم المقاطعة	قمح	شعير	بقوليات	بساتين	خضراوات
١	قرية بعشيقية	٠	٠	٠	٠	٠	٣١	جنحي	٤٦٠	٣٩٠	٧	٥٠	١٧
٢	بعشيقية الغربية	٧٩٠	٥٠١	٣٦	١٨٧	٥٧	٣٢	وادي السماق	٥١٥	٤٠٠	٠	٠	٠
٣	بعشيقية الشرقية	٥٨٥	٤٠٥	٢٥	٣٣٣	١٤	٣٣	عمر قابجي	١٧٩٠	١٢١٠	٨	١٣٢	٦
٤	قصر راس بعشيقية	٩٢٢	٥٦٨	١٥	٠	٠	٣٤	كانونة	١١٧٥	٨١٠	٦	١٤٧	٠
٥	بساتين بعشيقية	٠	٠	٠	١٩٩	٠	٣٥	الفاضلية	١١٣٠	٨٢٠	٤٥	١١٥٤	٦
٦	بحزاني الجنوبية	٨٨٠	٥٨٠	٤٢	٢٠٧	٧٩	٣٦	خورسيباط	١٥٨٠	١٣٦٠	١٠	١٩٣	٧
٧	بحزاني الشمالية	١٧٠	٩٠	٧	٦٩	١٨	٣٧	باريمة	٨٩٠	٦٢٠	٦	١٠١	٨
٨	بساتين بحزاني	٠	٠	١٠	١٣٤	٢٠	٣٨	طوبزواه	١٧٨٥	١٩٤٠	٠	١٩	٠
٩	قرية بحزاني	٠	٠	٠	٠	٠	٣٩	حصار	١٦٥٠	١٢٣٥	٥٠	٠	٩٢
١٠	قصر راس بحزاني	٢٤٠	١٧٠	٠	٠	٠	٤٠	كليجة	١٢٧٤	٧٣٠	٥٥	٠	٦
١١	كداد	٢٢١٥	١٠١٠	٥٥	٠	٠	٤١	قلعة نوك	٢٠٣	٩٠	٣٥	١٩	٣٠
١٢	كويكان	١٥٣٥	٤٩٥٩	٧٢	٠	٠	٤٢	شيخ شيلي	٥٦٥	٣٠٥	٠	٠	٠
١٣	ابو جربوعة	١٣٦٠	١٢٤٠	٣٥	٢٦	٠	٤٣	باعذرة عرب	١٢٠	٩٥	٠	٠	٠
١٤	الدرائش	٦٧٥	٤٦٣	٢٥	٠	٠	٤٤	اسقوف	٦٩٠	٤٧٥	٠	٠	٠
١٥	مصر سويد	٣١٥	١٩٧	٠	٠	٠	٤٥	خراب دليل	٣١٠	٤٠١	٠	٠	٠
١٦	قرية تبة شبك	٣٦٠	٣٩٥	٦	١٩٨	٠	٤٦	تيس خراب	٩٦٠	٨٣٠	٦	٢٠	١٧
١٧	كوري غريبان	١٠٢٧	١١٦٠	٠	٤٩	٠	٤٧	جوكرجي	٤٣٥	٣٤٥	٠	٠	٠
١٨	قولان تبة	٢٤٥	٢٩٠	٣٠	٥١	١٩	٤٨	سيكاني	١٥٧٤	٧٩٠	١٤٥	٣٩	٣٠٧
١٩	كاني ماران	٤٩٥	٢١٨	٠	٠	٠	٤٩	دوبردان	١٢٢٥	٦٤٥	٦٥	٠	١٧
٢٠	شورك مح	١٧٨٥	٩٣٥	٧	٠	٠	٥٠	بير حلان	١١٧٥	٧١٠	٠	٠	٠
٢١	جبران	١٩٧٥	٦٢٥	٥٨	٠	٠	٥١	قوبان	٥٣٥	٤١٠	٢٠	٠	٠٠
٢٢	شرق جران	٧٩٠	٢٣٥	٣٠	٠	٠	٥٢	احه جق	٦٦٠	٥٠٥	٣٥	٤١	٠
٢٣	اورطة خراب	١٩٢٥	٢١٦٠	٧	٨١	٧	٥٣	ابو جربوعة	١٣٦٠	١٢٤٠	٣٥	٢٦	٠
٢٤	تليارة	١١٣٥	١٢٧٠	٠	٨	٠	٥٤	قرية الدرايش	١٦٥٠	١٤٢٠	١٣٥	٤٦	٦
٢٥	مغارة مقلوب	٧٢٠	٣١٠	٠	٠	٠	٥٥	قر تبة شبك	٣٦٠	٣٩٥	٦	١٩٨	٠
٢٦	تل بايزيد	٢١٥	٢٧٠	٠	٠	٠	٥٦	بلدية اورطة	٠	٠	٠	٠	٠
٢٧	باببوخت	٧٢٠	٨٧٥	٥٥	٧٥٨	٢١	٥٧	خراب	٠	٠	٠	٠	٠
٢٨	بازواية	١٤٨٥	١٦٩٠	٠	٥١	٠	٥٧	بلدية الفاضلية	٠	٠	٠	٠	٠
٢٩	ميركي	٦٤٠	٢٥٥	٢٠	١٩	٠	٥٧						
٣٠	قرية ديرك	٦٧٥	٤٦٣	٢٥	٠	٠	٥٧						

المصدر: مديرية زراعة نينوى، قسم الاحصاء، بيانات غير منشورة، ٢٠١٩.