

الخصائص البيئية لنهر الفرات في مدينة الناصرية

أ: الاختلافات الفصلية في بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية

أ.د صادق علي حسين أ.د أزهار علي الصابونجي د.كامل كاظم فهد
قسم الأسماك والثروة البحرية، كلية الزراعة، جامعة البصرة
البصرة، العراق

الملخص:

درست عدد من الخصائص البيئية الفيزيائية والكيميائية لمياه نهر الفرات في مدينة الناصرية وعلى اساس شهري للفترة من حزيران ٢٠٠٠ ولغاية ٢٠٠١. اذ اختيرت محطتين لانجاز الدراسة، كانت المحطة الاولى على بعد كيلومتر واحد قبل دخول نهر الفرات الى الناصرية والمحطة الثانية في مركز المدينة قرب جسر النصر بمسافة تبعد ٥ كم عن المحطة الاولى. سجلت تغيرات شهرية ملحوظة في قيم كافة العوامل اللاحياتية المدروسة. وقد سجلت اوطا القيم لدرجات حرارة الهواء والماء للمحطتين في كانون الثاني واعلاها في تموز. كانت ادنى قيم لنفاذية الضوء (٧٠) سم سجلت في المحطة الثانية في تشرين الاول واعلاها (١٣٠) سم سجلت في المحطة الاولى خلال شباط. تميزت تراكيز الملوحة بالارتفاع خلال تموز وتراوحت بين (٢.٢٠-٥.٠٣) و (٢.١٤-٥.٠١) غم/ لتر وللمحطتين على التوالي. سجلت ادنى التراكيز للاوكسجين الذائب خلال شهر تموز. وتميزت قيم المتطلب الحيوي للاوكسجين بارتفاعها خلال اشهر الصيف. واطهرت الدراسة ان قيم الاس الهيدروجيني كانت في الجانب القاعدي. وتذبذبت قيم ثاني اوكسيد الكربون وسجلت غيابا تاما في بعض الاشهر. وكانت اعلى قيم للقاعدية الكلية في شباط (١٩٠ و ١٩٥) ملغم / لتر للمحطتين على التوالي وكانت تعود الى البيكربونات. اوضحت الدراسة ان مياه النهر عالية العسرة وكانت اعلى القيم في شباط. وسجلت تراكيز ايون الكالسيوم فيما اعلى من المغنيسيوم طيلة فترة الدراسة وكانت بيئة الدراسة غنية بالكبريتات اذ سجلت اعلى القيم خلال كانون الثاني.

المقدمة:

يعد الاهتمام بالموارد المائية والمحافظة على نوعية مياهها وأهلاتها من الأحياء مهما وحيويا لتأمين الأغراض المنزلية والخدمات الأخرى كالري والصناعة والزراعة والنقل وتوليد الطاقة الكهربائية. اهتمت العديد من الدراسات بالخصائص البيئية الفيزيائية والكيميائية لمياه نهر الفرات والبحيرات المتصلة به (Al-Nimma, 1982). اللامي والعبدي ١٩٩٦ الامارة وجماعته Al-lami et al 1998; Hassan 1997; 1996 السعدي وجماعته (١٩٩٩). وهناك دراسات محدودة حول نهر الفرات عند مروره بمدينة الناصرية اذ انجز Faraj and

(Mansor 1987) دراسة قصيره الامد لتقييم نوعيه

مياه الفرات بين الناصرية وسوق الشيوخ. ولم تجري اية دراسة تفصيلية طويلة الامد على منطقة الدراسة الحالية ويهدف البحث الحالي الى دراسة بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للنهر عند مدينة الناصرية لتحديد مدى ملائمتها للاستخدامات البشرية ولإسناد حياة الاسماك. وصف منطقة الدراسة:

يعتبر نهر الفرات من اطول الانهار في منطقة الشرق الاوسط ويحتل الترتيب الرابع والعشرين بين انهار العالم (Whitton ١٩٧٥)، ويبلغ طول النهر في الاراضي العراقية حوالي (١١٥٩) كم (السعدي وجماعته، ١٩٩٩) بعد خروجه من منطقة البوكمال

الكذبة باستخدام جهاز قياس الكذبة نوع HACH موديل A٢١٠٠ وعبر عن النتائج بوحدة كذبة نفثالين (NTU). حسب درجة الملوحة باستخدام جهاز التوصيل الكهربائي نوع TOA موديل CM-8ET وضرب ناتج القياس بثابت ٠.٦٤ وعبر عن الناتج بملغم/ لتر. قيس درجة الاس الهيدروجيني باستخدام جهاز pH نوع GTC موديل Lesibolo. اتبعت الطرق الموضحة في كتاب جمعية الصحة الامريكية (APHA 1985) في تحديد قيم ثنائي اوكسيد الكاربون والقاعدية الكلية والعسرة الكلية والكالسيوم والمغنسيوم والكبريتات وحسبت قيم المتطلب الحيوي للاوكسجين (BOD5) من حاصل طرح الاوكسجين الذائب بعد حفظ العينة في الظلام بدرجة ٢٠ درجة مئوية ولمدة خمسة ايام.

النتائج:

يبين جدول (١) التغيرات الشهرية للعوامل البيئية المقاسة في محطتي الدراسة لنهر الفرات ويوضح الشكل (٢) التغيرات الشهرية في درجة حرارة الهواء لمحطتي الدراسة اذ اظهرت قيم درجة الحرارة ارتفاعا ملحوظا من نيسان لغاية تشرين الاول وسجلت اعلى القيم في تموز للمحطتين الاول (٣٩) م والثانية (٣٨) م وادناها في كانون الثاني اذ بلغت (١٤-١٥) م للمحطتين على التوالي. ويبين الشكل (٣) التغيرات الشهرية في قيم درجة حرارة الماء اذ تناغم ميول البياني مع ذلك لدرجة حرارة الهواء وسجلت اعلى القيم خلال الاشهر بدأ من نيسان وحتى تشرين الاول، لكن اعلى القيم سجلت في تموز (٣١-٣١.٥) م للمحطة الاولى والثانية على التوالي بينما كانت ادنى القيم في كانون الثاني للمحطة الاولى (١٣.٥) م والثانية (١٤.٥) م. يظهر الشكل (٤) الاختلافات الشهرية في نفاذية الضوء خلال عمود الماء اذ تراوحت مديات النفاذية في المحطة الاولى (٧٠-١٣٠) سم وللمحطة الثانية (٧٥-١٢٨) سم وتميزت بالارتفاع النسبي للمدة من كانون الثاني ولغاية آذار وبلغت ذروتها في شباط ولوحظ ميول القيم الى الانخفاض التدريجي في نيسان وأيار اما قيم الكذبة فقد تراوحت مدياتها في المحطة الاولى بين (٨-١٩.٥) وحدة كذبة نفثالين. بينما تراوحت مديات القيم في المحطة الثانية (٩-٢٠) وحدة كذبة نفثالين شكل (٥) يوضح الشكل (٦) التغيرات الشهرية في قيم الملوحة ولمحطتي الدراسة خلال فترة جمع العينات اذ اظهرت القيم اختلافات شهرية ويلاحظ انحدارا واضحا مع تذبذب بسيط في قيم الملوحة اعتبارا من ايلول الى آذار. وتراوحت مديات القيم للمحطة الاولى بين (٢.٢٠ - ٥.٠٣) غم / لتر وللمحطة الثانية (٢.١٤ - ٥.٠١) غم / لتر. وسجلت الدراسة ارتفاعاً مميزاً في

في سوريا. انشأ سد القادسية في عام ١٩٨٧ على النهر بعد دخوله الاراضي العراقية. وكانت حصة النهر السنوية من الماء قبل انشاء سد الرقة في سوريا حوالي (٢٩) الف متر مكعب (السعدي وجماعته، ١٩٨٦) وبلغت حصة النهر قبل انشاء سد اتاتورك في تركيا ٢٧ x ١٠ ٩ م في عام ١٩٩٠ وتدنّت الى ١٠٩ x ٣ م في عام ١٩٩٩ والى مادون ذلك بكثير في وقتنا الحاضر. ويبلغ عمق الماء بين ٢ - ١٠ م بسرعة تبلغ ٠.٢-٠.٥ م / ثا في الفصول الجافة وبسرعة ١.٥ م / ثا في وقت الفيضان ولا يصعب في هذا النهر أي رافد داخل الحدود العراقية. Asaad, et al, 1986). وتتردى نوعية مياه نهر الفرات عند خروجه من منطقة الشنافية في الديوانية اذ يمر بمملحة السماوة وتضاعلت امكانية الاعتماد عليه لتلبية احتياجات الاستخدامات المنزلية. وتصب في نهر الفرات ينابيع المناطق الجوفية (ام غيلة والبو هليل) لترفع الملوحة الى ٦.٤ غم / لتر. ولا تتفرع من نهر الفرات في منطقة الدراسة اية فروع. جفت مناطق الاهوار التي يخترقها نهر الفرات بعد اجتيازه مدينة الناصرية لتحويلها الى مناطق زراعية على ضفتي النهر وانشأت قنوات ري ومبازل وحافظ النهر على مساره. وانشأت العديد من السدود على طول نهر الفرات داخل العراق بهدف حماية المدن من الفيضان ولاغراض الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية كما استغل بعضها للاغراض السياحية. اشار الكبيسي (١٩٩٦) الى التحسن النسبي لنوعية مياه دجلة والفرات نتيجة اقامة نهر المصب العام الذي ادى الى توفير مساحات مائية جديدة قد تستغل في الاستزراع السمكي ويهدف الى تصريف المياه المالحة وبطاقة تصريفية قدرها ٨٠ مليون طن سنويا Hussein et al., 2000). وتعد مياه نهر الفرات من المياه الدافئة مما يتيح ملاعمتها بينيا للاستزراع السمكي (السعدي وجماعته، ١٩٩٩). اختيرت محطتان لانجاز الدراسة الحالية. اذ تقع المحطة الاولى عند مدخل النهر الى مدينة الناصرية قبل محطة توليد الطاقة لكهربائية في الناصرية، بحدود كيلو متر واحد واختيرت المحطة الثانية بمسافة تبعد ٥ كم عن موقع المحطة الاولى باتجاه اسفل النهر عند جسر النصر وموقع اسالة ماء الناصرية شكل (١).

المواد وطرائق العمل:

جمعت عينات من الماء من منطقتي الدراسة وبواقع عينة واحدة شهريا على مدى عام كامل بدأ من حزيران ٢٠٠٠ ولغاية ايار ٢٠٠١. قيس درجة حرارة الهواء والماء باستخدام محرار زنيقي مدرج لغاية ٠.١ درجة مئوية وقيست نفاذية الضوء باستخدام قرص ساكي اذ اخذ معدل قراءتين. تم قياس

ملغم/ لتر والثانية (١٨١) ملغم/ لتر في كانون الثاني وظهرت التراكيز الشهرية لايون المغنسيوم شكل (١٤) تذبذباً واضحاً لم يأخذ ميولا مميزاً . اذ سجلت التراكيز في المحطة الاولى (٣٤) ملغم/ لتر في تشرين الاول واعلاها في كانون الثاني (١٣٠) ملغم/ لتر بينما سجلت ادنى القيم للمحطة الثانية (٣٧) ملغم / لتر في تشرين الثاني وسجلت اعلاها في ايلول (٢٦) ملغم/ لتر. يظهر شكل (١٥) التغيرات الشهرية في تراكيز الكبريتات (SO4) لمحطتي الدراسة على مدار السنة اذ اظهرت القيم تذبذباً واضحاً وسجلت ارتفاعاً مميزاً في كانون الثاني للمحطة الاولى بلغت (١١٢٥) ملغم/ لتر والمحطة الثانية (١١٠٠) ملغم/ لتر وظهرت القيم انخفاضاً ملحوظاً في كانون الاول ونيسان اذ بلغ ادنى تركيز (٤٤٠) ملغم/ لتر في المحطة الاولى . اظهرت نتائج التحليل الاحصائي عدم وجود فروق معنوية بين محطتي الدراسة ووجدت علاقة معنوية موجبة بين الحرارة والملوحة وعلاقة معنوية سالبة بين الاوكسجين الذائب ودرجة حرارة الماء وعلاقة معنوية موجبة بين بين العسرة والملوحة والكالسيوم.

المناقشة :

اظهرت النتائج تغيرات شهرية واضحة في درجة حرارة الهواء والماء قد تعزى الى الاختلافات في شدة سطوع الشمس وطول فترة الاضاءة اليومية والاختلافات المناخية الاخرى . وظهرت ميولا منسجماً مع درجة حرارة الماء . اذ تميل درجة الحرارة السطحية للماء في اكثر الاحيان الى التوافق مع درجة حرارة الهواء (Talling 1980) . وسجلت تغيرات موقعية طفيفة في درجة حرارة الماء بين المحطتين وقد يعود ذلك الى التباين في وقت جمع العينات . وتعد درجة حرارة الماء من اكثر الخصائص الفيزيائية اهمية في البيئة المائية لانها تؤثر على تواجد الاحياء المائية وكثافتها وتوزيعها ونموها فضلاً على تأثيرها على الخصائص الكيميائية وتفاعلها (Hussein,et al.,2000 ; Kinnish,1986) . وقد تفسر الاختلافات في نفاذية الضوء في عمود الماء بعوامل عديدة منها خارجية تتلخص بالحالة الجوية السائدة وصفاء السماء ومنها داخلية تشمل كمية ونوعية المواد العالقة والذائبة وحركة المياه (Wetsteyn and Kromkamp,1994) وقد يفسر ارتفاع قيم النفاذية بشكل ملحوظ خلال اشهر الشتاء وتناقص كثافة الهائمات النباتية وقلة حركة الماء وعمليات الاثارة. كما اظهرت قيم النفاذية تفاوتاً موقعياً وضمن المحطة الواحدة . وتتفق هذه النتائج مع (٢٠٠٠)

قيم الملوحة للمحطتين من حزيران ولغاية ايلول . بينما سجلت ادنى القيم في اذار . اظهرت قيم الاوكسجين الذائبكل(٧) توافقا مع الحدود المقبولة لاسناد حياة الاحياء المائية وسجلت ادنى القيم خلال الاشهر الدافئة اعتباراً من حزيران ولغاية تشرين الاول . وكانت ادناها في تموز للمحطة الاولى (٥) ملغم / لتر والثانية (٤.٨) ملغم / لتر وبلغت ذروتها في كانون الثاني وكانت القيم (٩.٢-٩.٥) ملغم / لتر للمحطتين على التوالي يوضح شكل (٨) التغيرات الشهرية في قيم المتطلب الحيوي للاوكسجين BOD اذ سجلت اعلى القيم في تموز وبلغت (٣.٥-٣.٤) ملغم / لتر للمحطة الاولى والثانية على التوالي بينما سجلت ادنى القيم في شباط اذ بلغت (١.٩-٢.٠) ملغم /لتر للمحطتين بنفس الترتيب اعلاه . وظهرت النتائج بان القيم العالية نسبياً سجلت خلال الاشهر الدافئة من السنة ويبين الشكل (٩) التذبذبات الشهرية في قيم الاس الهيدروجيني pH لمحطتي الدراسة خلال مدة جمع العينات ، اذ ظهرت النتائج بان القيم كانت في الاتجاه القاعدي على مدار السنة وسجلت اعلى القيم خلال شهر شباط اذ بلغت للمحطة الاولى (٧.٩٥) والثانية (٧.٥٩) بينما سجلت ادنى قيم في حزيران للمحطة الاولى (٧.٦٠) والثانية (٧.٥٩) . اما الاختلافات الشهرية في قيم ثنائي اوكسيد الكربون شكل (١٠) فقد اظهرت انحداراً تدريجياً بدا من تموز ولغاية كانون الاول ليكن غائبا تماماً خلال كانون الثاني وشباط في المحطة الاولى وخلال شباط فقط في المحطة الثانية ثم بدأت القيم بالارتفاع تدريجياً ولغاية ايار لتتسجم مع قيم المرتفعة نسبياً والمسجلة خلال الاشهر الدافئة . وسجلت اعلى قيم للمحطتين الاولى (٨) ملغم / لتر والثانية (٩) ملغم / لتر في تموز . وسجلت تغيرات شهرية طفيفة في قيم القاعدية الكلية شكل (١١) ولوحظت اعلى القيم في شباط للمحطة الاولى (١٩٠) ملغم / لتر والثانية (١٩٥) ملغم / لتر ، وسجلت ادناها في اذار اذ لم يرتفع مداها عن (١٥٠) ملغم / لتر . يظهر شكل (١٢) التغيرات الشهرية في قيم العسرة الكلية ويلاحظ ان القيم اظهرت تذبذباً واضحاً وسجلت انحداراً تدريجياً من حزيران ولغاية تشرين الثاني حيث سجلت اوطا القيم (٦٣٠-٣٥٥) ملغم / لتر للمحطتين الاولى والثانية على التوالي . وسجلت القيم ذروتها في شباط للمحطة الاولى (٨٨٠) ملغم/لتر والثانية (٨٤٠) ملغم/ لتر ، ويوضح شكل (١٣) الاختلافات الشهرية في تراكيز ايون الكالسيوم ، وظهرت القيم انحداراً واضحاً من نيسان وحتى كانون الثاني وسجلت ادنى القيم في تشرين الثاني اذ بلغت (٧٩-٨) ملغم / لتر للمحطتين على التوالي وبلغت ذروتها للمحطتين الاولى (١٣٦)




المتطلب الحيوي -ملغم/لتر		الايوكسجين ملغم/لتر		الملوحة غم/لتر		الكثرة وحدتكثرة /نفثالين		نفاذية الضوء		حرارة الماء م		حرارة الهواء م		Months
st.2	st.1	st.2	st.1	st.2	st.1	st.2	st.1	st.2	st.1	st.2	st.1	st.2	st.1	
3.4	3.2	5.2	5.5	4.85	4.94	18	17	95	92	30	30.5	37.5	38	Jun
3.4	3.5	4.8	5	5.02	5.01	16	15	94	91	31.5	31	38	39	Jul
2.8	2.1	6.4	6.2	4.92	4.68	17	17.5	86	90	30.5	30	37	37	Aug
2.6	2.4	7.2	7	4.62	4.93	18.9	18	84	85	28	28	35.5	36	Sep
2.8	2.6	7.5	7.8	3.26	2.97	20	19.5	75	70	26	26	34	34	Oct
2.4	2.5	8.5	9	2.7	2.94	17.8	17	80	85	17	16	19	18	Nov
2.6	2.2	8.8	8.9	2.73	2.75	16	15	95	97	15.5	15	17	16	Dec
2.5	2	9.5	9.2	3.26	3.11	11	12	97	96	13.5	14.5	15	14	Jan
2	1.9	9.1	9.1	2.99	3	9	8	130	128	16	15	19	17.5	Feb
2.4	2.1	8.6	9	2.03	2.16	10	11	115	120	22	21	25.5	26	Mar
2.1	2.3	8.5	8.7	2.36	2.34	11	12	94	90	28	28.5	32	31	Apr
2.5	2.4	7.7	7.6	3.83	3.31	12	11	82	80	29	28	33	32	May
الكبريتات ملغم/لتر		المقسيوم ملغم/لتر		الكالسيوم ملغم/لتر		العسرة ملغم/لتر		القاعدية ملغم/لتر		ثاني اوكسيد الكاربون ملغم/لر		الاس الهيدروجيني		Months
st.2	st.1	st.2	st.1	st.2	st.1	st.2	st.1	st.2	st.1	st.2	st.1	st.2	st.1	
850	920	122	120	112	130	790	725	145	158	7.8	7.5	7.59	7.6	Jun
1004	1034	119	74	102	112	750	825	160	170	8.9	8	7.61	7.64	Jul
801	838	101	104	109	112	800	587	141	140	6.4	6.9	7.65	7.69	Aug
685	683	126	80	106	96	788	712	145	152	4.9	5.2	7.72	7.88	Sep
888	898	82	34	86	88	560	570	154	152	5.9	4.9	7.75	7.78	Oct
760	743	37	83	79	80	355	360	150	180	4.5	4.5	7.72	7.72	Nov
480	478	64	70	114	112	560	550	190	180	2.4	4	7.75	7.8	Dec
1100	1245	72	130	181	136	760	570	165	160	1	0	7.85	7.95	Jan
650	607	87	84	91	112	840	880	195	190	0	0	7.92	7.96	Feb
812	850	75	71	130	128	640	630	143	149	1.9	1	7.82	7.8	Mar
460	470	86	93	108	104	630	620	149	150	4	5	7.75	7.7	Apr
680	502	88	93	115	112	670	650	160	165	6.7	6	7.84	7.8	May

جدول (١) التغيرات الشهرية للعوامل البيئية في محطتي الدراسة لنهر الفرات


وتنشأ الكدرة في الماء نتيجة لوجود المواد العالقة مثل الطين والغرين والمواد العضوية واللاعضوية والهائمات (اللامبي، ١٩٩٨). اظهرت النتائج ارتفاعاً نسبياً في تراكيز الملوحة في اشهر الصيف ويعزى ذلك الى تدني مستوى الماء وارتفاع درجة الحرارة التي تؤدي الى زيادة معدل التبخر (Arndt and Al-Saadi, 1975). وقد تفسر لارتفاع مناسيب المياه الجوفية في وسط وجنوب العراق (اللامبي، ١٩٩٨).

(Hussein, et al, ٢٠٠٨) ويعزى انخفاض القيم في تشرين الاول الى زيادة التصريف (Hannan and Young, 1974) بالاضافة الى زيادة حركة الماء وتأثير الرياح (عبد الله ١٩٨٩). وتميزت المدة من تموز لغاية تشرين الاول بارتفاع الكدرة وهذا ما لاحظته سعد (١٩٨٠) عند دراسته للاجزاء السفلى من نهر الفرات.


والزراعية المصرفة الى البيئة (Wetzel,1983) اذ تحتوي الفضلات المنزلية على مواد عضوية حاملة للكبريتات مثل الميثيونين والستين والتي تضيف تراكيز عالية من عنصر الكبريت عند تحليلها بفعل الاحياء المجهرية وتوصل الاسدي (١٩٨٣) الى نفس النتائج عند دراسته بيئة نهر شط العرب .




واظهرت النتائج ارتفاع قيم الاوكسجين الذائب خلال اشهر الشتاء نتيجة لارتفاع قابلية الاذابة وقلة الاستهلاك بسبب قلة نشاط الاحياء (Saad and Antoine, 1978) ، وتتفق هذه النتائج مع ماسجله اللامي (١٩٩٨) في دراسته لنهر الفرات . اما تدني قيم الاوكسجين المذاب في الاشهر الحارة من السنة فقد يعزى الى ارتفاع درجة الحرارة اذ تتناسب عكسياً مع ذوبان الغازات (Ruttner,1963) فضلاً عن زيادة كمية المادة العضوية بسبب طرح فضلات المجاري مباشرة الى النهر دون معالجة وارتفاع نسبة الاستهلاك نتيجة للتنفس والفعاليات الحيوية الاخرى (Welch, 1964) . وتميزت الدراسة الحالية بارتفاع قيم المتطلب الحيوي للاوكسجين BOD في اشهر الصيف وانخفاضها في اشهر الشتاء اذ يؤدي ارتفاع درجة الحرارة الى زيادة تحلل المواد العضوية بفعل الاكسدة الناتجة من نشاط الاحياء المجهرية (Wada,1993) . ويعتبر مقياس المتطلب الحيوي للاوكسجين دليلاً مهماً للاستدلال على التلوث العضوي للمياه كما يشير الى كمية الاوكسجين الذائب المستهلكة من قبل الاحياء المجهرية في عملية الاكسدة الهوائية للمواد العضوية (Stirling , 1985) . كانت قيم الاس الهيدروجيني pH في بيئة الدراسة ضمن الاتجاه القاعدي وتتفق هذه النتائج مع نتائج (AL-Nimma ١٩٨٢) على نهر الفرات ، ومنسجمة مع طبيعة بنبات المياه العراقية الاخرى (Al-Saadi et al.,1989 ; Al-Lami et al.,1998 ; Hussein and Attee,2001 ; Hussein et al.,2000) . وقد يعزى ارتفاع قيم الاس الهيدروجيني في اشهر الشتاء الى سيادة الايونات القاعدية (Golterman et al.,1978) . وتتأثر قيم ثاني اوكسيد الكربون بعدة عوامل منها التركيب الضوئي والتنفس ودرجة حرارة الماء وتحلل المواد العضوية (Brown,1980;Goldman and Horn,1983) . وتتأثر قاعدية الماء بعوامل مختلفة منها تركيز ثاني اوكسيد الكربون ونشاط الاحياء المجهرية والانتاجية الاولى (Reid, 1961) . وتعود القاعدية الكلية الى ايونات الكربونات ويعزى انخفاض قيم القاعدية في اب الى استنزاف ثاني اوكسيد الكربون الحر من قبل الاحياء المنتجة وما يرافقه من تحلل للبيكاربونات (Hussein and Attee , 2001) . وتصنف مياه بيئة الدراسة على انها عالية العسرة اعتماداً على تصنيف (١٩٧٩، Lind) . وتتفق نتائج الدراسة مع ماوجده (Al - Lami , 1998; Hassan , 1997 ; Al-Nimma, 1982) . سجل ارتفاعاً في قيم الكبريتات في بعض الاشهر وقد يفسر بزيادة كمية الفضلات المنزلية




شكل (٨) التغيرات الشهرية في قيم المتطلب الحيوي للأوكسجين




شكل (٤) التغيرات الشهرية لقيم نفاذية الضوء لمحطتي الدراسة




شكل (١٠) التغيرات الشهرية لقيم ثنائي اوكسيد الكربون لمحطتي الدراسة




شكل (٥) التغيرات الشهرية لقيم الكدرة لمحطتي الدراسة




شكل (٩) التغيرات الشهرية لتركيز ايون الهيدروجين لمحطتي الدراسة




شكل (٦) التغيرات الشهرية في قيم الملوحة لمحطتي الدراسة




شكل (٧) التغيرات الشهرية لقيم الاوكسجين المذاب لمحطتي الدراسة




شكل (١٤) التغيرات الشهرية في تركيز ايون الكالسيوم لمحطتي الدراسة




شكل (١٥) التغيرات الشهرية في قيم القاعدية الكلية لمحطتي الدراسة



شكل (١٦) التغيرات الشهرية لقيم ايون الكبريت لمحطتي الدراسة



شكل (١٧) التغيرات الشهرية في قيم العسرة الكلية لمحطتي الدراسة



شكل (١٨) التغيرات الشهرية في قيم ايون الكالسيوم لمحطتي الدراسة

المصادر

- الاسدي منال كامل (١٩٨٣) نظام توزيع بعض الاملاح المغذية في شط العرب وعدد من فروعها في مدينة البصرة - رسالة ماجستير جامعة البصرة . ص (١٦٣)
- الامارة فارس جاسم القششة عبد الكريم عبد الله نجوى اسحق (١٩٩٦) دراسة تأثير المخلفات الصناعية في مواصفات نهر الدوانية . مجلة وادي الرافدين لعلوم البحار . ١١ (٢) ١١٣-٣٤٠ .
- السعدي حسين علي اللامي غلي عبد الزهرة وقاسم ثائر ابراهيم (١٩٩٩) دراسة الخواص البيئية لآباري نهري دجلة والفرات وعلاقتها بتربية الثروة السمكية في العراق مجلة كلية التربية للبنات ٢ (٢)
- اللامي علي عبد الزهرة والبيدي خنساء حميد (١٩٩٦) دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لخزان الثرثار العراق مجلة كلية التربية للبنات جامعة بغداد ٨ (٢) ٢٠-٢٨ .

- reaches of Saddam River. 1.Environmental characteristic . Basrah ., J.Agric. Sci. 13 (2).
Hussein, S.A. and Attee, R.S.(2001) . Comparative study on limnological features of Shatt Al-Arab estuary and Mehejran canal 1. Seasonal Variations in a biotic factors Basrah . Agric Sci . 13 (1).
Kinnish , M.J (1986) . Ecology of estuaries . Vol.I.physical and chemical aspecctes. CRC press. Lnc Boca Raton. Florida (254) pp.
Lind, O. T. (1979). Handbok of common method in limnology 2nd ed . London (199)pp.
Reid, G. K. (1961). Ecology of Inland water and estuaries. Reinhold publ corp. New York.
Ruttner, F.(1963). Fundamentals of Limnology .Third ed Canada Univ. of Toronto press (307)pp.
Saad, M. A. H. and Antoine, S, E, (1978). Limnological studies on the river Tigris Iraq 111. Seasonal variations of nutrients. 1nt. Revue Ges. Hydrobiol. 63:705-716.
Stirling, H. P. (1985). Chemical and Biological methods of water analysis for aqua culture list, Stirling, Scotland.
Talling, J. F. (1980). Water characteristic in Euphrates and Tigris in Mesopotamia. In : Rzoska J. (Ed.) Ecology and Density. The Hague – Boston – London, Junk (Monogr.Biol.38),63-81.
Wada, M.(1993).Relationship between water pollution and bacterial flora in river water Nippon- Eiseigaku-Zasshi. 48(3):707-720.
Welch, P.S (1964).Limnology . 2nd .ed. Mc Graw-Hill Book Co. ,New York, 538pp.
Wetzel, R.G.(1983).Limnology .2nd Ed-Saunders college pub . philadelphia 850 pp
Witton, B. A. (1975). River Ecology. Blackwell Scientific publications. Oxford.
Wetsteyn, L. P. M. and Kromkamp,J.C.(1994). Turbidity.Nutrients and phytoplankton primary production in the Ooscherhelde (The Netherlands) before ,during and after a large scale coastal engineering product (1980-1990).Hydrobiol.253:61-78.
الكبيسي عبد الرحمن عبد الجبار (١٩٩٦) الواقع البيئي لنهر المصب العام اطروحة دكتوراه جامعة بغداد
عبد الله داود سلمان محمد (١٩٨٩) الانتاجية الاولى لهائمات النباتية والعوامل البيئية المؤثرة عليها في قناة شط البصرة رسالة ماجستير جامعة البصرة ص (٩٥)
Al-Lami,A.A.;Al-
Saadi,H.A.;Kassim,T.I.(1998).Limnological features of Qadisia lake . North –West .Iraq Al-
Mustansiriya J.Sci. 9(2):59-66.
Al-Nimma , B.A.(1982) . Study on the limnology Tigris and Euphrates rivers. M.Sc . Thesis . Univ .
Salahaddyn , Iraq , 252 pp .
APHA , Standard methods for examination of water . and wast water , American Public Health Association pub. 16 th edition 1268 pp-1985 .
Arndt , S.E. and Al- Saadi, H. A. (1975) . Some Hydrographical characteristics of the Shatt Al –Arab and Adjacent areas .Wess. Zeit .Univ. R ostock, Math. Nat . Reih. 24: 789-796.
Al-Saadi, H.A. ;Hadi ,A. A. ; and Al-Lami. (1989) . Limnological studies on some marssh areas in southern Iraq. Limnological.20(2).
Assaad,N.M. Hassan,F.M.; and Noury,N. (1986). Detailed study on the water quality of Iraq. 11.Water quality of Euphrates River. Sci. Bull. No. 123pp.179. Ministry of irrigation. Water and Soil Res. Institute.
Brown, S. L. (1980). Ecology of fresh water. Heinmann Educational Books Ltd. 78pp.
Faraj, F. A.; Mansor, m. J. (1987). Evaluation of Water Quality in Lower Euphrates. J. Agric. Water Reso.6,2,243-256.
Goldman ,C.P. and Horn , A.L.(1983). Limnology. Mc Grow Hill international book company. (464)pp.
Golterman,H.L.; Clymo, R.S. and Ohnstad, M.AM. (1978).Methods for physical and chemical analysis of fresh waters. 2nd ed.Blakwell Scientific Publication Ltd. Oxford 214pp.
Guset,E. (1966). Flora of Iraq. Vol.1.Ministry of Agriculture, Baghdad.21pp.
Hannan,H.H. and Young, W.J. (1974). The influence of adeep storage reservoir the physical chemical limnology of the central Texas river. Hydrobiol. 44(2-3):177- 207.
Hassan,F. M. (1997).Alimnological study on Hilla river,Al-MustansiryahJ.Sci.8(1):22- 30.
Hussein, S. A. Essa, S. A. and Al-Manshed, (2000).Limnological investigations to the lower